

アレイル[®]SC

登録番号：第24219号
 有効成分：ハロスルフロンメチル…… 1.8%
 メタゾスルフロン …… 2.4%
 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 容量：500ml

茎葉処理除草剤なのに、茎葉はもちろん根からも作用する、新しいレスキュー剤！

- 散布1時間後に雨が降っても効果を発揮。もう、天気予報を気にして作業工程を変える必要はありません。
- 大きくなってしまった雑草もしっかり枯殺します。

◇茎葉処理剤、なのに、根からも吸収！

だから

雨で成分が土に落ちて、優れた効果を発揮！



■ ノビエに対する効果



ノビエ5葉期 浅水処理 処理日:2014年9月15日
 散布薬量:500ml/10a 散布水量:100ℓ/10a
 調査日:処理22日後 日産化学(株) 生物科学研究所温室



■ クサネムに対する効果



クサネム 草丈30~40cm 落水処理 処理日:2018年9月6日
 散布薬量:500ml/10a 散布水量:100ℓ/10a 処理1時間後に10mm降雨
 調査日:処理43日後 日産化学(株) 生物科学研究所温室

■ 適用雑草と使用方法

本剤及び、それぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数 [#]	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ	移植後25日～ ノビエ5葉期 収穫45日前まで ※出穂始期 15日前まで	500ml/10a	100ℓ/10a	本剤 1回 ハロスルフロンメチル剤 2回以内 メタゾスルフロン剤 2回以内	落水散布 又は ごく浅く 湛水して 散布

※薬害の恐れがあるので、必ず散布適期を守って散布してください。

■ 各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	5葉期まで
ホタルイ	花茎10cmまで
ミズガヤツリ	草丈25cmまで
ウリカワ	6葉期まで
ヘラオモダカ	
セリ	増殖期まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
コウキヤガラ	草丈50cmまで*

*登録は草丈90cmまでですが、安定した効果のため50cmまでの使用をおすすめします

■ 使用時期

使用時期は、移植後25日～出穂始期15日前(収穫45日前)です。落水またはごく浅水にして散布してください。



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2019年4月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
 ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
 お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00~17:30 土日祝日除く)

茎葉処理除草剤なのに…
田面・水面に落ちた成分が
根からも吸収!

新登場



茎葉はもちろん、根からも作用する、
新しいレスキュー剤です。

- 散布1時間後に雨が降っても効果を発揮。
もう、天気予報を気にして作業工程を変える必要はありません。
- 大きくなってしまった雑草*もしっかり枯殺。
*草種によって枯らせる大きさは異なります。詳しくは裏面をご覧ください。

新・水稲用 中後期茎葉処理除草剤

アレイル[®] SC

※アルテア®はメタソルフロンの変称です。®は日産化学(株)の登録商標



地上部だけでなく
地下部も…

茎葉からも、
根からも吸収!

