

**【ディアナSCの適用害虫と使用方法】**

農林水産省登録 第22910号 有効成分:スピネトラム…11.7%

2015年2月末日現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
トマト	アザミウマ類、コナジラミ類	2,500	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ミニトマト	ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2,500~					
なす	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、オオタバコガ	5,000					
	コナジラミ類	2,500					
ピーマン	アザミウマ類	2,500~ 5,000					
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガ、アザミウマ類						
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ						
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ						
ブロッコリー	コナガ						
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ	2,500					
カリフラワー	コナガ、ハスモンヨトウ						
かぶ	コナガ、ハスモンヨトウ						
メロン	タバココナジラミ	2,500					
	アザミウマ類	2,500~ 5,000					
きゅうり	アザミウマ類、ハモグリバエ類						
たまねぎ	アザミウマ類						
ねぎ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ネギハモグリバエ	2,500					
にら	アザミウマ類						
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2,500~ 5,000					
レタス	ハモグリバエ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ						
非結球レタス	アザミウマ類、ハスモンヨトウ						
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ						
アスパラガス	ハスモンヨトウ	100~500ℓ/10a					
かんしょ	ハスモンヨトウ	100~300ℓ/10a					
豆類(未成熟)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類						
豆類(種実、ただし、 らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	2,500					
稲	イネツトムシ、コブノメイガ	4,000~ 6,000	60~150ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)
茶	チャノココカモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、ヨモギエダシヤク、チャノキイロアザミウマ、チャトゲコナジラミ	2,500~ 5,000	200~400ℓ/10a	摘採前日まで			
花き類・観葉植物	アザミウマ類、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2,500	100~300ℓ/10a	発生初期			2回以内
わた	オオタバコガ						
	アザミウマ類	2,500					

**【ディアナWDGの適用害虫と使用方法】**

農林水産省登録 第22909号 有効成分:スピネトラム…25.0%

2015年2月末日現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
りんご	ハマキムシ類、シンクイムシ類、キンモンホソガ、ケムシ類、ヨモギエダシヤク、ギンモンハモグリガ	5,000~ 10,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
もも	モモハモグリガ、シンクイムシ類、ハマキムシ類						
ネクタリン	モモハモグリガ、シンクイムシ類						
おうとう	オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類						
かき	アザミウマ類						
なし	シンクイムシ類、ハマキムシ類、チュウゴクナシキジラミ、チャノキイロアザミウマ						
すもも	シンクイムシ類						
ぶどう	ハスモンヨトウ						
	チャノキイロアザミウマ						
かんきつ	ミカンハモグリガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、	5,000~ 10,000					
いちじく	アザミウマ類	5,000					
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類	5,000~ 10,000					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	10,000					

**使用上の注意**

- 使用前によく振ってから使用してください。(SC)
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に拾餌しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、できるだけ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、できるだけ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

27H3C15D139:ZS

2015年3月作成(全新企画社)

篠原商店で購入する場合はこのページをクリック!

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCC GROUP

**住友化学**

住友化学株式会社

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>

適用拡大

登録作物  
40種類以上に

豊作の女神。



殺虫剤

# ディアナ<sup>®</sup>

## SC・WDG

様々な害虫から大事な作物を守り、  
豊かな実りをかなえます。



- 🌙 広い殺虫スペクトラム
- 🌙 速やかな食害抑制効果
- 🌙 収穫前日まで使用可能  
(稲のみ収穫7日前まで)

