

ご購入される場合はこちらのページをクリック!

殺菌剤
日曹 **ファンタジスタ**
顆粒水和剤

有効成分：ピリベンカルブ……………40.0%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

特長

- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸透性、莖部から上位葉への浸透移行性を有します。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、モニリア病 褐斑病、斑点落葉病 すす点病、黒点病 輪紋病	3000~4000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	すす斑病、うどんこ病 炭疽病	3000倍					
おうとう	灰星病、幼果菌核病 褐色せん孔病	3000倍	200~700ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病、黒斑病 輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌) 炭疽病	3000~4000倍 3000倍					
ぶどう	灰色かび病、晚腐病 黒とう病	3000~4000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
もも ネクタリン	灰星病、黒星病 ホモプンス腐敗病	3000倍					
かんきつ	灰色かび病、そうか病 黒点病	2000~4000倍	200~400ℓ /10a	収穫14日前 まで	1回	散布	1回
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症	3000倍					
豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい、 あずき、 いんげんまめを除く)	菌核病 灰色かび病	2000倍	100~300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
あずき いんげんまめ	菌核病 灰色かび病、炭疽病	2000~4000倍					
だいず	菌核病 紫斑病	2000~4000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍					
トマト ミニトマト	灰色かび病 菌核病、葉かび病	2000~3000倍	100~200ℓ /10a	収穫14日前 まで	5回以内	散布	5回以内
なす	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍					
いちご	炭疽病	2000倍	100~200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
キャベツ	菌核病 灰色かび病	2000~3000倍 3000倍					
レタス	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	100~200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
非結球レタス	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍					
たまねぎ	灰色かび病、小菌核病 灰色腐敗病	2000~4000倍 2000~3000倍	100~200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合は、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用を控えてください。
- 畜に対して影響があるので、周辺の畜舎にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スボン、長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

販売元  **日本曹達株式会社**
本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084
ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>
大阪支店 ☎(06)6229-7343 関東営業所 ☎(048)677-6010
札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003
仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336
信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315

No. 421-1410TO

本資料は2014年10月現在の登録内容に基づいています。



果樹・野菜の病害防除に新戦力

攻守に優れたミラクルアシスト



農林水産省登録
第23103号

野菜の病害防除に新戦力!

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

日曹ファンタジスタ

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



殺菌剤の
オールラウンドプレイヤー
新登場



日本曹達株式会社

果樹・野菜の病害防除に新戦力!

農林水産省登録
第23103号

攻守に優れた
ミラクルアシスト!!

殺菌剤

日曹ファンタジスタ®

顆粒水和剤

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標



殺菌剤の
オールラウンドプレイヤー
新登場



日本曹達株式会社

殺菌剤
日曹ファンタジスタ®
顆粒水和剤

有効成分：ピリベンカルブ.....40.0%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



特長

- 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
- 野菜類の菌核病や灰色かび病に高い防除効果を示します。
- 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
- 各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
- 葉の内部への浸達性、基部から上位葉への浸透移行性を有します。


適用病害と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
トマト	灰色かび病						
ミニトマト	菌核病、葉かび病						
なす	灰色かび病、菌核病						
いちご	灰色かび病						
キャベツ	菌核病	2000~3000倍		収穫14日前 まで			
	灰色かび病	3000倍	収穫3日前 まで				
レタス	灰色かび病、菌核病	2000~3000倍	収穫14日前 まで	5回以内		5回以内	
非結球レタス			収穫3日前 まで				
たまねぎ	灰色かび病	2000~4000倍	100~200ℓ /10a	収穫前日 まで	5回以内	5回以内	
	灰色腐敗病	2000~3000倍					

上記のほか、りんご、おうとう、もも、茶、豆類などの作物に登録があります。


試験事例

● キャベツの菌核病に対する防除効果



■ 試験場名/群馬県農業技術センター高冷地野菜研究センター(2003年)
■ 発生状況/中発生(発病株率:15.8%)
■ 耕種概要/播種5月22日、定植6月26日
■ 品種/長陽
■ 区制面積/1区8.9㎡、60株、2連制
■ 散布月日/7月29日、8月10日、20日、27日(合計4回) 200ℓ/10a
■ 調査月日/9月9日

● いちごの灰色かび病に対する防除効果



■ 試験場名/日本植物防疫協会研究所(2003年)
■ 発生状況/少発生(接種、累計発病果率:10.1%)
■ 耕種概要/定植:平成15年10月9日、株間×条間(cm):25×20
■ 品種/女峰
■ 区制面積/1区2.5㎡、18株、3連制
■ 散布月日/2月10日、20日、27日、3月5日、12日(計5回)
■ 調査月日/2月24日から3月19日まで計5回

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて薬液を調整し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- なすに使用する場合は、高温条件下で果実に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の蜜源にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物または新品種には本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。尚、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料は2014年10月現在の登録内容に基づいています。

販売元



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084
ホームページアドレス <http://www.nippoan-soda.co.jp/nougyo/>
大阪支店 ☎(06)6229-7343 関東営業所 ☎(048)677-6010
札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)239-0003
仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336
信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315

No. 419-1410TO

野菜の病害防除に新戦力

攻守に優れたミラクルアシスト