



**適用雑草と使用方法**

（2017年1月現在の登録内容）

**■ カウンシルコンプリート1キロ粒剤**

有効成分：テフリルトリオン…3.0% トリアファモン…0.50% 農林水産省登録：第23792号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量	使用回数*	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ、クログワイ オモダカ、ヒルムシロ セリ、コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ、シズイ キシウズズメノヒエ	移植後5日～ノビエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	1kg	本剤 1回 テフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる散布
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	は種時 は種直後～ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			は種同時散布機で施用 湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる散布

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

**■ カウンシルコンプリートフロアブル**

有効成分：テフリルトリオン…5.8% トリアファモン…0.97% 農林水産省登録：第23794号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量	使用回数*	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ、クログワイ オモダカ、ヒルムシロ セリ、コウキヤガラ	移植後5日～ノビエ 3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	500mℓ	本剤 1回 テフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	原液湛水散布 又は 水口施用 又は 無人ヘリコプターによる滴下
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ	稲1葉期～ノビエ 3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			原液湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる滴下

本剤が多量に稲体に付着した場合に、付着した葉ならびに直後に伸展してくる新葉1～2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。なお、ノズル散布をした場合、白化症状が強くなる場合があります。

**■ カウンシルコンプリートジャンボ**

有効成分：テフリルトリオン…10.0% トリアファモン…1.6% 農林水産省登録：第23796号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量	使用回数*	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ、クログワイ オモダカ、ヒルムシロ セリ、コウキヤガラ	移植後5日～ノビエ 3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装（パック） 10個（300g）	本剤 1回 テフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	水田に 小包装（パック）のまま 投げ入れる
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ 3葉期 ただし、 収穫90日前まで			

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

\*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

**注意事項**

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3～3.5葉期までに時期を失しないように散布して下さい。
- 散布の際は、水の出入りを止めて十分な湛水状態（水深3～5cm・ジャンボは5～6cm）のまま、まきむらが生じないように均一に散布して下さい。また、極端な浅水や深水での使用はさけて下さい。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないで下さい。また、入水は静かに行ってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 以下の条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけて下さい。
  - ①砂質土壌の水田及び漏水田（減水深2cm/日以上）
  - ②軟弱苗を移植した水田
  - ③極端な浅植えの水田及び浮き苗の多い水田
- 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないで下さい。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合がありますので使用はさけて下さい。
- 散布田の田面水を他の作物に灌水しないで下さい。

- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物として、なす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しないで下さい。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意して下さい。
- 無人ヘリコプターで散布する場合（1キロ粒剤・フロアブル剤）は、使用機種の使用基準に従って実施して下さい。水源池、飲料用水等に本剤が流入しないように十分注意して下さい。フロアブル剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理して下さい。また、本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稲以外の作物への薬液散布には使用しないで下さい。
- 水口施用（フロアブル剤）の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態（湛水深3～5cm）に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意して下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用して下さい。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く

(F-3249 17.01.IS)

篠原商店でご購入される場合は  
このページをクリック!

# カウンスルコンプリートの特長



2成分で高い除草効果

ノビエへの優れた効果  
(枯殺効果・残効性)

難防除雑草への高い効果  
(クログワイ・オモダカ・コウキヤガラ)

特殊雑草にも有効  
(キシウスズメノヒエ・アシカキ・イボクサ・クサネム等)

水稲に対する高い安全性

直播水稲に適した薬剤性能  
(鉄コーティング直播にも対応)

## 適用表

# カウンスルコンプリート1キロ粒剤



赤字：適用拡大(H29, 1,25付)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ* キシウスズメノヒエ	移植後5日～ ノビエ 3.5葉期 ただし、 移植後30日まで	1kg/ 10a	本剤; 1回 トリアフモン; 2回 テフリルトリオン; 2回	湛水散布又は 無人ヘリコプター による散布
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	は種時			は種同時散布機 で施用
		は種直後～ ノビエ 3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			湛水散布又は 無人ヘリコプター による散布

# カウンシルコンプリートの殺草スペクトラム

薬剤	一年生雑草								多年生雑草										
	ノビエ	カヤツリグサ	コナギ	アゼナ類	キカシグサ	ヒメミソハギ	クサネム	イボクサ	ホタルイ	マツバイ	ミスガヤツリ	ウリカワ	セリ	ヒルムシロ	クロゲワイ	オモダカ	コウキヤガラ	シズイ	
トリア ファモン	◎	◎	×	○	△	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○
テフリル トリオン	○	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○
カウンシル コンプリート	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	○

◎;極大、○;有効、△;やや不十分、×;不十分

◆ カウンシルコンプリートはSU抵抗性雑草を含むほぼ全ての水田雑草に高い効果を示します。



# カウンシル® コンプリート

“除草力”のカウンシル。  
高葉齢ノビエも！難防除も！

ノビエ、難防除雑草を「一発処理」で枯らす除草力。鉄コーティング直播栽培にも適応。多角化・大規模化に貢献できる次世代の水稲用除草剤です。

コウキヤガラ

クログワイ

ノビエ

オモダカ



## 新登場

### 1キロ粒剤

大型規格  
4kg入り



1kg入り

### フロアブル

大型規格  
2L入り



500ml入り

### ジャンボ

大型規格  
900g  
(30パック入り)



300g (10/パック入り)

#### 2成分で高い除草効果

新規成分トリアファモン(ALS阻害)とテフリルトリオン(白化作用)の2種混合の初・中期一発処理除草剤で、幅広い草種に対して高い除草効果を示します。

#### ノビエへの優れた効果

高葉齢のノビエに対する枯殺力が高く、また、長期残効性を有します。

#### 問題雑草への高い効果

クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果・塊茎形成抑制効果を示します。効果持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。

#### 特殊雑草にも有効

アシカキ、エソノサヤヌカグサ、キシウスズメノヒエ等の多年生イネ科雑草やクサネム、イボクサ等の特殊雑草にも有効です。

#### 水稲に対する高い安全性

水稲に対して優れた選択性を有し、通常の圃場条件下で安心して使用できます。

#### 直播水稲に適した薬剤性能

直播水稲(鉄コーティング直播栽培含む)において、本剤は効果・安全性ともに優れ、1キロ粒剤はは種時からノビエ3.5葉期まで、フロアブルは稲1葉期からノビエ3.5葉期まで、ジャンボが稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布時期で余裕をもって使用できます。

