


根っから強い。
だから、生育が濃い。



種子処理で強い根を育て、
生長を助ける殺虫・殺菌剤。

 **クルーザー[®]MAXX**

syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標

- は種前の種子処理により、発芽直後から初期病害虫を防除
- 出芽前、出芽後のタネバエやネキリムシを防除
- 高品質で収量が安定した豆づくりに貢献し、防除作業を軽減
- 黒根腐病をはじめ、幅広い立枯性病害に有効です
- 種子処理だから天候に左右されず、防除適期を逃さないで安心
- フロアブル製剤なので、いやなにおい、粉立ちがない

寒冷地や水田転換畑の大豆・えだまめの収量・品質向上への第一歩は苗立率・初期生育の改善から。

低温・過湿条件下では作物の生理活性が低下し、茎疫病などの病害にもかかりやすくなります

クルーザーMAXXは過湿条件下で問題となる「茎疫病」などの病害から大豆を守ります。苗立率が向上するとともに、生育が旺盛になります。

■湿田状態(地下水位4cm)での生育の違い(播種後36日)



病原菌からのストレスによって根が浅くなると、夏の干ばつに弱くなります

クルーザーMAXXの殺菌成分が、根部を病原菌の感染から保護。豊かで活力のある根部を形成し、干ばつ耐性が向上します。

■水田転換畑における根の状態(えだまめ収穫期)



処理方法

処理前



計量カップなどで計量した原液(乾燥種子1kg当り原液8ml)を用意します。種子処理は、種の直前に行なうようにしましょう。

例1 ミキサーによる塗沫処理

しばらく回転させ、豆に均等に青色が付着すれば処理終了です。

推奨: 種子30kg以上



例2 肥料混和機による塗沫処理

容器のふたを閉め、なるべく均一なスピードでハンドルを回し、全体に均等に青色が付着するまで回転させます。

推奨: 種子10~30kg程度



例3 ビニール袋による塗沫処理

ビニール袋の口をしっかりと閉め、上下左右によく振り、全体に均等に青色が付着するまで混ぜます。

推奨: 種子5kg程度



例4 ビニールシートによる塗沫処理

数人でシートの四隅を持ち、こぼれないようにゆすって全体に均等に青色が付着するまで混ぜます。

推奨: 種子10~20kg程度



処理後



塗沫後は平らな容器や新聞紙に広げて、大豆・えだまめは30分以上、小豆は数時間(播種前日までの処理をお薦めします)乾燥させてください。



種子処理手順を動画でご確認いただけます。大豆への塗沫から乾燥まで注意すべきポイントと共にご紹介していますので、ぜひご覧ください。

■適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアマトキサムを含む農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	アブラムシ類、タネバエ、苗立枯病(ピシウム菌)、リゾクトニア根腐病	原液	乾燥種子1kg当り8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内)	1回
だいず	アブラムシ類、タネバエ、ネキリムシ類、フタスジヒメハムシ、茎疫病、リゾクトニア根腐病、苗立枯病(ピシウム菌)、紫斑病、黒根腐病							4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)	4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
えだまめ	アブラムシ類、タネバエ、白網病							4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)	1回
あずき	アブラムシ類、タネバエ、茎疫病							4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)	1回

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアマトキサムを含む農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
だいず	ハト、キジバトによる種子食害忌避	原液	乾燥種子1kg当り8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	1回	4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
えだまめ								4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)	1回

■使用上の注意事項(抜粋)

●使用の際は農業用マスク、保護眼鏡、不透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするともに衣服を交換してください。●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。●ダストが飛散しないよう強風の際は播種を控えるとともに、真空播種機を使用する場合はディフレクターを付けるなどしてください。●処理済みの種子は地表に残らないよう適切に播種してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階
[ウェブサイト] <http://www.syngenta.co.jp>

