



殺菌剤

# メジャーフロアブル

有効成分 ピコキシストロピン…22.5%

毒性 普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称）

## 特長1

### 幅広い病害に効果があり、作物がきれいに仕上がる！

べと病、菌核病、灰色かび病、すす枯病など多種の病害防除に高い効果を発揮するので、作物がきれいに仕上がります。

## 特長2

### 効果に安心！

浸透性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮します。

## 特長3

### 使いやすい！

適用の作物、病害に対して、薬害の心配や耐性菌の影響が少なく、収穫前日数も短いため使いやすい汎用殺菌剤です。

## 【試験成績】

### たまねぎ/べと病



試験場名：山口県農林総合技術センター 2012年  
 品種：早生7号 定植日：2011/11/7 処理日：3/14,22,30 4/9,18(計5回)  
 接種日：3/14 越冬罹病株を配置 調査日：4/27 発生状況：少発生(接種)  
(公的機関等での実用性評価試験の為、登録の使用回数とは異なります。)

### ねぎ/さび病



試験場名：日本農業(株)鳥取県 現地農場 2015年 [社内試験]  
 品種：龍光1号 定植日：7/13  
 処理日：11/12 調査日：11/26 発生状況：中発生

### レタス/べと病



試験場名：長野県野菜花き試験場佐久支場 2012年  
 品種：サウザー 播種日：5/15 定植日：6/6  
 処理日：6/26, 7/3, 11(計3回) 調査日：7/19  
 発生状況：少発生

## 【適用病害虫および使用方法】

〈2016年6月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピコキシストロピンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	株腐病	2000倍	100~300ℓ / 10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	べと病 黒斑病						
レタス 非結球レタス	べと病 菌核病 灰色かび病 すす枯病						
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病						
ねぎ	さび病 べと病 黒斑病			収穫前日まで			

## 正しく安全にお使いいただくために

- 浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると薬害を生じるおそれがあるので、展着剤加用に当たっては事前にその適否を確認してください。
- キャベツ、はくさい、非結球レタスに使用する場合、幼苗期に散布すると薬害を生じる場合があるので、使用を避けてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせることで輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所に置かないでください。●使用後の空容器等は農場などに放置せず、適切に処理してください。

篠原商店でご購入される場合は  
こちらのページをクリック!



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>

2016年6月作成版 (SPA)DY11606S



# 驚きの威力で 幅広い病害を併殺！



## 新登場

### 殺菌剤

# メシジャー<sup>®</sup> プロアブル

®は日本農薬の登録商標



※写真はイメージです



ねぎ／さび病



ねぎ／黒斑病



たまねぎ／べと病



たまねぎ／灰色かび病



レタス／菌核病



レタス／べと病