

ニマイバー[®]

水和剤

有効成分：ジエトフェンカルブ…25.0% ベノミル…25.0%



- ### 特長
- ① 予防・治療のダブルの効果
 - ② 耐性菌と感受性菌の同時防除が可能
 - ③ 優れた耐雨性

適用病害の範囲及び使用方法

2018年10月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジエトフェンカルブを含む農業の総使用回数	ベノミルを含む農業の総使用回数		
キャベツ	菌核病	1,000	100~300	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	7回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内)		
レタス	灰色かび病			収穫14日前まで				5回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)	
たまねぎ	灰色腐敗病			収穫7日前まで	5回以内		6回以内 (種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注または は苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内)			
トマト	灰色かび病			収穫前日まで	3回以内		6回以内	4回以内 (種子への処理は1回以内、灌注は2回 以内、散布は3回以内)		
ミニトマト	菌核病						3回以内	5回以内		
なす	黒枯病						4回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)			
きゅうり	菌核病						4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)			
豆類 (未成熟、但し、えだまめ、さや いんげん、さやえんどうを除く)	炭疽病			200~700	200~400		摘採14日前まで	1回	1回	6回以内 (種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、 散布は3回以内)
えだまめ	灰色かび病									4回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)
さやいんげん	菌核病									4回以内 (種子粉衣は1回以内)
さやえんどう	炭疽病									6回以内 (種子粉衣は1回以内、育苗期の灌注は3回以内、本圃定 植後の灌注は1回以内、散布は3回以内)
豆類 (種実、但し、だいず、 らっかせいを除く)	菌核病			200~400	200~400		摘採14日前まで	1回	1回	6回以内
だいず	紫斑病	9回以内 (種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬は1回 以内、育苗期の灌注は3回以内、本圃定 植後の灌注は1回以内、散布は3回以内)								
いちご	灰色かび病	200~700	200~700	摘採前日まで	3回以内	3回以内	6回以内			
かき	落葉病						3回以内	6回以内		
茶	炭疽病	200~400	200~400	摘採14日前まで	1回	1回	6回以内			
	輪斑病、新梢枯死症 褐色円瘡病						1回	1回		

使用上の注意

⚠ 安全使用上の注意 (抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、作用性の異なる薬剤と組み合わせず使用してください。
- 本剤はエトフェンプロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさけてください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の

責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産物植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かない。 ● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

30H11K18N29:Z

2018年11月作成(全農教)

篠原商店でご購入される場合はこのページをクリック!

大地のめぐみ、まっすぐくへ
SCG GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川12丁目27番1号

お客様相談室 ☎ 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>



新規殺菌剤
ニマイバー水和剤

農林水産省登録
第23975号

作物の病害は見逃さぬ



新発売

耐性菌にも強い2成分混合殺菌剤

ニマイバー[®]


水和剤

ニマイバーは住友化学(株)の登録商標

様々な
作物に



ダイズ紫斑病



アスキ灰色かび病



チャ輪斑病



キュウリ褐斑病



トマト葉かび病

(出典：大分県農林水産研究指導センター)