

シグナムWDGは作用性の異なる2つの有効成分を混合することで、野菜のさまざまな病気をダブルでブロックします。

広範囲の病害に有効

作用性の異なる2成分が、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、黒斑病、菌核病、べと病など、幅広い病害を抑えます。

優れた予防効果と持続効果

2成分共に病原菌の「孢子発芽」を阻害し、早く植物体内に取り込まれるため、優れた予防効果と、残効性を発揮します。

■適用作物・適用病害と使用方法

2014年10月現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(l/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロピンを含む農薬の総使用回数	ホスカリドを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ	灰色腐敗病	500	100~300	定植直前	1回	5分間 苗根部浸漬	4回以内 (定植前は1回以内、 定植後は3回以内)	4回以内 (定植前は1回以内、 定植後は3回以内)	
	灰色かび病 べと病 小菌核病	1500			3回以内				
キャベツ	菌核病 株腐病	1500~2000		収穫7日前まで	2回以内		2回以内	2回以内	2回以内
	べと病 菌核病								
はくさい	白斑病 黒斑病 べと病 白さび病	1500~2000		収穫前日まで	3回以内		3回以内	3回以内	3回以内
	灰色かび病 菌核病	1500							
なす	すすかび病	1500~2000		収穫前日まで	3回以内		3回以内	3回以内	3回以内
すいか	炭疽病 うどんこ病 つる枯病	1500							
	かぼちゃ	うどんこ病		1500~2000	収穫14日前まで		2回以内	2回以内	2回以内
にんじん	黒葉枯病	2000							
にんにく	さび病 白斑葉枯病 黄斑病	1500	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内		
	灰色かび病 菌核病 すそ枯病							1500~2000	
レタス 非結球レタス	べと病	1500	収穫14日前まで	1回	1回	1回	1回		
ブロッコリー	菌核病	1500							
	いちご	べと病	1500~2000	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	
灰色かび病 うどんこ病 炭疽病		1500							
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 すすかび病	2000	収穫前日まで	2回以内	2回以内	2回以内	3回以内		
ピーマン	うどんこ病	2000							
ししとう	炭疽病 黒枯病	2000					2回以内		

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用は避け、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- なすに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると薬害が生じる恐れがあるので、避けてください。
- 蚕に対して影響があるので周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠️ 安全使用上の注意

- 誤飲・誤食などのないよう注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の担当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の担当を受けてください。

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長スポン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

⚠️ 水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠️ 貯蔵上の注意

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。 ● 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ● 防除日誌を記載しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階
 ☎ 0120-014-660 FAX 03-3796-9419
 ホームページ <http://www.agriculture.japan.basf.com>

®=BASF社の登録商標

2つの有効成分が優れた予防効果と持続性を発揮

BASF
The Chemical Company



シグナム® WDG

○ 新たに適用となった作物



病気に感染させたくない!!



はくさい/べと病



はくさい/白斑病



キャベツ/菌核病



レタス/灰色かび病



たまねぎ/灰色腐敗病



にんにく/さび病



にんじん/黒葉枯病



すいか/炭疽病



トマト/葉かび病



いちご/うどんこ病