



- は種前～定植後いずれに散布しても出芽・生育に影響はありません。
- 早く枯らし、長く雑草の発生を抑えます。
- 有効成分のグルホシネートPは土壌中で速やかに分解されます。

農林水産省登録 第22901号 ザクサ®は Meiji Seika ファルマ(株)の登録商標

■野菜類の適用雑草と使用方法

有効成分:グルホシネートPナトリウム塩…11.5% 人畜毒性:普通毒(毒劇物に該当しないものを指している通称)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 *1 (mL/10a)	*2 使用回数
キャベツ	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)	300~500	2回以内
きゅうり なす ピーマン トマト ミニトマト		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)		3回以内
メロン レタス		収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)		2回以内
にんじん		収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理)		3回以内
アスパラガス		収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)		2回以内
ねぎ		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)		
たまねぎ		収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は畦間処理)		
ざといも		収穫30日前まで (雑草生育期 植付前又は畦間処理)		

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 *1 (mL/10a)	*2 使用回数
やまのいも	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	3回以内
かんしょ		収穫30日前まで (雑草生育期 挿苗前又は畦間処理)		2回以内
*3 ばれいしょ		雑草生育期 萌芽前処理	100~200	1回
豆類 (未成熟、ただし えだまめを除く)		収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内
		収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)		3回以内
えだまめ		収穫14日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)		2回以内
ほうれんそう		収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は畦間処理)		
しそ		収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)		

- *1 希釈水量10アール当たり100~150ℓを雑草茎葉散布してください。
- *2 本剤、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農業の総使用回数を示します。
- *3 ばれいしょでのグルホシネート及びグルホシネートPを含む農業の総使用回数は、3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)です。

ザクサ液剤適用作物(※詳しくは製品ラベルをご確認ください。)

果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちじょう(種子)、くり、キウイフルーツを除く)、かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ、いちじょう(種子)、くり、キャベツ、きゅうり、なす、ピーマン、トマト、ミニトマト、メロン、レタス、にんじん、アスパラガス、ねぎ、たまねぎ、ざといも、やまのいも、かんしょ、ばれいしょ、豆類(種実、ただしらっかせいを除く)、豆類(未成熟、ただしえだまめを除く)、えだまめ、そば、ほうれんそう、しそ、水田作物、水田作物(水田畦畔)、茶、たばこ、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等

■上手な使い方



畑のうね間処理に登録のある作物であれば、安心してうね間処理する事ができます。飛散防止カバーを付け、ザクサノズルを使ってまんべんなく散布してください。

■便利なザクサノズル



ザクサノズルをお使いいただくと飛散が少なく、より効果的に散布できます。散布後が白く見えるため、散布ムラを防げます。

■使用上の注意事項

- △ 効果・被害等の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
 - 散布直後の降雨は効果を減らすので、天候をよく見きわめてから散布してください。
 - 雑草の生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣りますので時期を失ないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布してください。
 - 植物に薬液が付着すると被害を生じますので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散ないように散布してください。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布してください。
 - 畜に対して影響がありますので、周辺の養畜にはかからないようにしてください。
 - 散布液を調製した容器及び散布器具は使用后十分に洗ってください。
 - 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- △ 安全使用上の注意
- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
 - 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。(刺激性)
 - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 - 使用残りの薬液は必ず安全な場所に保管してください。
 - 養魚田周辺での使用には注意してください(魚類)。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場や用水路などに放置せず、適切に処理してください。

お問い合わせ/ご注文は

meiji Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2-4-16

http://www.meiji-seika-pharma.co.jp/

野菜の雑草防除に!!



キャベツ

きゅうり



トマト

ピーマン



メロン

アスパラガス



たまねぎ

にんじん

■ ザクサ液剤の除草効果



散布前

散布14日後

天下無草



非選択性茎葉処理除草剤

ザクサ
液剤



ザクサ®はMeiji Seika ファルマ(株)の登録商標
農林水産省登録 第22901号